


PÁGALO POMARINO


Stercorarius pomarinus



Adulto

Andrés de la Cruz

Plumas centrales de la cola en cuchara o pala



Andrés de la Cruz

Base de las primarias blancas

IDENTIFICACIÓN

De entre los tres págalos que se pueden ver con frecuencia en las costas malagueñas, el págalo pomarino ocuparía el tamaño intermedio. Como el págalo grande, es un ave mediana-grande, con una envergadura de 120 cm aproximadamente, y al igual que esta especie también despliega un vuelo pesado dirigido y recto y presenta las ventanas claras en la base de las primarias. El rasgo más distintivo de esta especie, frente a los otros dos págalos que suelen verse en Málaga, es una prolongación del par central de plumas de la cola en forma de "cuchara" o "paleta". El págalo parásito también tiene las plumas centrales de la cola más largas, pero son estrechas y puntiagudas. Los ejemplares de págalo pomarino pueden presentar dos "fases" en función de la coloración del plumaje. Los ejemplares de la fase clara (la más común) tienen la barriga y garganta blancas y la nuca pintada de amarillo pálido. Los ejemplares de la fase oscura presentan un plumaje uniformemente negro, donde sólo destacan las ventanas blancas de la base de las primarias.

DÓNDE VERLA

Menos frecuente que el págalo grande en nuestro litoral. Al igual que este, es una especie pelágica, es decir, de mar adentro. Su comportamiento a la hora de robar el alimento a otras especies de aves marinas hace que con frecuencia las veamos siguiendo grupos de gaviotas.

CUÁNDO VERLA

"En migración" e "invernante".

ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	díc
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

ESPECIES SIMILARES

Véase págalo grande y págalo parásito.