





# *Lestes barbarus*



Longueur : 40-45 mm. Envergure de l'aile postérieure : 20-27 mm.

**Mâle:** **1.** Partie supérieure des yeux de couleur marron. **2.** Thorax couleur paille avec de larges bandes vert métallisé (avec parfois de légers reflets de bronze). **3.** Abdomen de couleur similaire au thorax, avec la partie supérieure verte. **4.** S9 et S10 sans pruinosité bleue ou de couleur blanchâtre et restreinte à S10. **5.** Appendices anaux inférieurs courbés vers l'extérieur. **6.** Ptérostigma bicolore marron et jaune pâle, les deux moitiés couvrant une surface plus ou moins similaire. **Femelle:** ses motifs et sa couleur sont très semblables à ceux du mâle, mais elle est plus robuste, avec un abdomen plus large (**7**) et présente un ovipositeur. Pour la différencier de la femelle de *Lestes virens* il faut observer avec attention l'étui de l'organe génital, qui est arrondi chez *L. barbarus* et pointu chez l'autre espèce (**8**).





### SON HABITAT

Elle se reproduit sur des lieux qui s'assèchent fréquemment, comme les mares temporaires et les lagunes endoréiques possédant une abondante végétation riveraine et des jonchaies. Elle peut aussi être observée le long des cours d'eau, principalement aux endroits où le courant est plus lent avec des forêts riveraines, peuplées de saules arbustifs.

### SON MODE DE VIE

Elle peut se disperser et être pionnière sur des étendues d'eau récentes ou à la temporalité élevée, pondant souvent dans la végétation de lieux totalement secs. Elle s'alimente de petits insectes volants qu'elle trouve parmi la végétation, au-dessus de laquelle elle effectue des vols courts qu'elle alterne avec des pauses fréquentes.

### QUAND LA VOIR

Dans la province elle a été observée de mars à octobre, toutefois il est plus courant de la voir entre mai et juillet.

jan	fév	mar	avr	mai	juin	juil	aoû	sep	oct	nov	déc
-----	-----	-----	-----	-----	------	------	-----	-----	-----	-----	-----

### OÙ LA VOIR DANS LA PROVINCE DE MÁLAGA

Elle est rare et localisée, seulement connue dans les lagunes de Fuente de Piedra (étape 18 du Grand Sentier de Malaga), Salada, Dulce, Capacete et Toro à Campillos (étape 19), la Ratosá à Alameda, Grande à Archidona et celle du Campamento Benítez, à Malaga. On la trouve aussi à l'embouchure du Guadalhorce et le long du ruisseau de la Pulga, à Cortes de la Frontera.

### LIBELLULES SIMILAIRES

Principalement *Lestes virens*.

### STATUT DE PROTECTION

Elle n'est pas menacée et ne fait l'objet d'aucune mesure de protection particulière dans la législation environnementale en vigueur.