

# FUMAREL CARIBLANCO

## *Chlidonias hybridus*



Eduardo Antúnez



Andrés de la Cruz

### IDENTIFICACIÓN

De estructura similar al fumarel común, esta especie es un poco más grande, con una envergadura que supera los 60 cm, aunque la diferencia de tamaño apenas resulta perceptible durante su identificación a cierta distancia. Es un fumarel gris muy pálido o color plata durante todo el año, presentando tonalidades más oscuras durante la época reproductora. La cabeza es negra presentando una mejilla y gargantas blancas bien notorias durante el verano. Durante el invierno, el fumarel cariblanco muestra la frente blanca con un capirote menos acusado o más recto que el que presenta el fumarel común. El pico es rojizo y robusto.

### DÓNDE VERLA

Ave de zonas húmedas, cuyas colonias de cría más cercanas se sitúan en las marismas de Doñana. Es frecuente en paso por el litoral malagueño. También puede observarse durante la migración en humedales interiores de la provincia.

### CUÁNDO VERLA

“En migración”.

ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

### ESPECIES SIMILARES

Véase fumarel común (*Chlidonias niger*).