


# ZARAPITO TRINADOR

## *Numenius phaeopus*



Javier Alba

### IDENTIFICACIÓN

Es el limícola de mayor tamaño (40 cm) que podemos observar en nuestro litoral y debe su nombre al carácter aflautado de su canto. Sus rasgos más distintivos son un pico largo y curvado hacia abajo, una línea oscura en el píleo y una brida también oscura en el ojo que define una ceja clara muy visible. El dorso es pardo barrado, de un patrón parecido al de la aguja colipinta (*Limosa lapponica*). Los zonas ventrales son de color claro y las patas de tonos gris azulados.

### DÓNDE VERLA

El zarapito trinador cría en el norte de Europa (Escandinavia, Rusia, Islandia y Escocia) y podemos verlo durante los pasos migratorios por toda la costa y por las áreas agrícolas y pastos próximos al litoral.

### CUÁNDO VERLA

"En migración" e "invernante".

Especie regular en la provincia en ambos pasos migratorios, y muy escasa como invernante.

ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

### ESPECIES SIMILARES

Zarapito real (*Numenius arquata*), de mayor tamaño y pico más largo. No presenta una ceja tan marcada. Es menos frecuente en la provincia y sus hábitos no son tan costeros.