

# VERDERÓN COMÚN

## *Chloris chloris*



HEMBRA. Eduardo Antúnez



MACHO. Ismael Pérez

Longitud: 15 cm

### IDENTIFICACIÓN

Esta ave propia de zonas arboladas; por su tamaño, apariencia robusta, cabeza grande y pico fuerte; recuerda a un gorrión, pero de color verde. El macho adulto presenta un plumaje verde o verde amarillento intenso, con una banda alar y los bordes de la cola de un amarillo vivo. El obispillo también es amarillento. Las hembras presentan tonos verdosos más apagados, con el amarillo de alas y cola más reducido. Los jóvenes son pardos con las partes inferiores claras y listadas, con un ligero toque verdoso. Las patas son de color carne.

Presenta el vuelo ondulado típico de los fringílicos y durante el mismo se aprecian bien las partes amarillas de alas y cola.

### DÓNDE Y CUÁNDO VERLA

Ave cada vez más frecuente en las calles arboladas, así como en parques y jardines. Es un ave muy común y bien distribuida por toda la provincia.

ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

### CURIOSIDADES

Como ocurre con otras aves, en invierno, a los verderones residentes en nuestras tierras se les unen verderones migradores provenientes de áreas más al norte. Estos, de otras subespecies, son por lo general de mayor tamaño que los residentes, con colores menos amarillentos, presentando el macho unas mejillas grisáceas más marcadas y el dorso más amarronado.