



Mattscheckiger Braun-Dickkopffalter

Thymelicus acteon (Rottemburg, 1775)

BESCHREIBUNG

Flügelspannweite: 2 bis 2,8 cm. **Flügeloberseite:** Beide Flügelseiten sind braun, der Hinterflügel hat eine Reihe von goldfarbenen Flecken, die einen Bogen formen. Bei den Weibchen sind sie besonders ausgeprägt, während die Flügelfarbe der Männchen eher goldfarben als braun ist und sie eine schwarze Linie (Duftschuppe) haben. **Flügelunterseite:** ist strohgelbfarben.

ABBILDUNG ZUR IDENTIFIZIERUNG

Weibchen



Eine Reihe bogenförmiger, goldfarbener Flecken

Brauner Untergrund

Männchen



Dünne, schwarze Linie (Duftschuppe)

Braun, fast goldfarben und weniger auffällige Flecken

Orangefarben



ÄHNLICHE ARTEN

Schwarzkolbiger Braun-Dickkopffalter: Nur mit geschlossenen Flügeln zu verwechseln, hat schwarze Fühlerspitzen. **Braunkolbiger Braun-Dickkopffalter:** Nur mit geschlossenen Flügeln zu verwechseln, hat strohgelbe Hinterflügel. **Komma-Dickkopffalter:** ist größer und robuster. Nur mit geöffneten Flügeln verwechselbar, aber mit weniger Punkten, die keinen Bogen formen. **Rostfarbiger Dickkopffalter:** ist größer und robuster und nur mit geöffneten Flügeln verwechselbar, aber mit weniger Punkten, die keinen Bogen formen. Darüber hinaus hat das Männchen eine größere schwarze Linie (Duftschuppe) und sowohl Weibchen als auch Männchen sind nicht so braun.



Dorada linea corta

Schwarzkolbiger Braun-Dickkopffalter



Dorada linea larga

Braunkolbiger Braun-Dickkopffalter



Dorada manchas blancas

Komma Dickkopffalter



Dorada orla ancha

Rostfarbiger Dickkopffalter

BIOLOGIE UND LEBENSRAUM

Es gibt nur eine Generation pro Jahr, die zwischen April und August, die meisten Exemplare im Mai und Juni, leben. Er lebt in jedem Lebensraum, wo es Kräuterpflanzen gibt. Daher findet man ihn auf Wiesen, Waldlichtungen und Unterholz in den Bergen, sogar an Küstengebieten, verlassenen Steinbrüchen, Straßengräben, Brachland, zwischen Anbauflächen und trockenen Fluss- oder Bachbetten. Die Raupen ernähren sich von verschiedenen Süßgräsern.

Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

VERBREITUNG

Der Mattscheckige Braun-Dickkopffalter ist der häufigste seiner Gattung hier in der Region Málaga. Er kann auf allen Etappen des GWM beobachtet werden. Auf den Etappen über Küstengebiete und im Norden der Region, wo die Landschaft aus Städten und landwirtschaftlichen genutzten Flächen besteht, ist er seltener, da er eher an Flüssen oder anderen Gegenden mit heimischer Vegetation beheimatet ist.

