

CURRUCA CAPIROTADA

Sylvia atricapilla



Eduardo Antúnez

Longitud: 13 cm Envergadura: 20-23 cm

IDENTIFICACIÓN

Curruca mediana, de aspecto corpulento. Su rasgo más distintivo es la "boina" que luce en la cabeza, negra en los machos y de color castaño en las hembras y juveniles. El dorso es de color pardo oliva y las partes inferiores son grises, con tonos más claros y rosados en las hembras. El macho puede recordar al de curruca cabecinegra, pero este último es más pequeño, exhibe un distintivo anillo ocular rojo y, en lugar de una boina, presenta toda la cabeza negra.

DÓNDE Y CUÁNDO VERLA

Es una de las curruca más arbóreas, estando muy vinculada a la vegetación de ribera. Se reproduce también en parques y jardines con árboles de gran porte, sobre todo si presentan olivos o acebuches o matorral mediterráneo con frutos.

Al igual que el petirrojo y el mosquitero común es un invernante muy abundante y ubicuo en las ciudades y durante este periodo podemos verlo en prácticamente cualquier zona verde urbana.

ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

CURIOSIDADES

El canto de la curruca capirota es uno de los más inusualmente aflautados de entre las curruca, pudiendo recordar al del mirlo. Sin embargo, mientras que el de este último es exclusivamente una mezcla de trinos que tiende a terminar con una nota más aguda, el de la curruca capirota tiene una primera parte en la que predominan las notas raspadas y una segunda parte brillante y de mayor volumen.