


# MIRLO CAPIBLANCO

*Turdus torquatus*



Juan Luis Muñoz

## IDENTIFICACIÓN

Ave del mismo género y de aspecto muy similar al mirlo común del que se distingue, sobre todo, por un babero blanco en forma de media luna que luce en el pecho. El plumaje presenta tonos oscuros, de color negro en el macho y pardo en la hembra, con un diseño escamado. El pico es amarillento, menos brillante que el del mirlo común. Las alas son pálidas con un reflejo grisáceo, visible durante el vuelo.

## DÓNDE VERLA

Su presencia en la provincia se limita principalmente al periodo invernal, aunque también se observan ejemplares migradores que cruzan al norte de África para pasar el invierno. Ocupa bosques aclarados de media y alta montaña que dispongan de arbustos con frutos para alimentarse. Se agrega en bandos cerca de pilones, fuentes, cabeceras de arroyos de montaña y zonas forestales con humedad. Bien distribuido por las áreas de montaña de la provincia, algunos de los mejores lugares para su observación pueden ser los Llanos de Libar, la Sierra de las Nieves, los sabinars del Chorro, Sierra Blanca o Tejeda y Almirara.

## CÓMO VIVE

Invernante en nuestra provincia. Sus lugares de cría más cercanos se sitúan en el norte de España, concretamente Cordillera Cantábrica y Pirineos. En sus territorios de cría se alimenta invertebrados y pequeños reptiles, además de frutos. Como invernante tiene una alimentación más frugívora, con preferencia por los frutos de majuelo y escaramujo.

## CUÁNDO VERLA

Invernante.

ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

## ESPECIES SIMILARES

Mirlo común (*Turdus merula*).