




ERIZO EUROPEO O COMÚN

Erinaceus europaeus



Identificación

Insectívoro de tamaño grande con una longitud cabeza-cuerpo de 30 a 40 cm, cola corta de 4 a 5 cm, cuerpo rechoncho y patas cortas. Se caracteriza por tener el dorso cubierto de púas (1), el hocico puntiagudo (2) y la cara descubierta (3), sin antifaz. El pelaje ventral, de la cara y las patas es pardo, blanquecino o amarillento. La cabeza y el cuerpo están unidas, sin que apenas se perciba el cuello. No hay diferencias apreciables entre machos y hembras.



Fenología



Reproducción



Hibernación

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Dónde vive

Especie que prefiere zonas con abundante cobertura vegetal y humedad. Está presente en herbazales, pastizales de ribera, huertos, jardines, cultivos en regadío y vegas arboladas. Ausente por encima de los 1.000 msnm en el mediterráneo.

Cómo vive

Animal nocturno. Sale de su madriguera dos horas después de la puesta del sol y se vuelve a esconder antes de que amanezca. Se alimenta de insectos, babosas y lombrices, aunque también consume huevos de aves, frutas y pequeños reptiles como culebras. Es un buen andarín, pudiendo llegar a moverse muy rápido si es necesario. Tiene un gran olfato. Utiliza huecos y raíces de árboles para hacer sus nidos, así como huecos entre piedras. Su principal defensa contra los depredadores es enroscarse, haciéndose una bola de púas inaccesible. A finales de otoño, cuando la temperatura ambiente desciende por debajo de los 10 °C, se aletarga, hecho una bola de púas, en su madriguera. Está en estado latente, con un metabolismo muy bajo, los latidos descienden de 180 hasta 20 por minuto y la temperatura corporal a 5 °C, hasta la llegada de la primavera. Puede despertarse algunos días, salir y darse una vuelta, volviendo a aletargarse de nuevo. En zonas de costa, próximas al mar, puede estar activo en invierno, aunque mucho menos que en verano. Sus territorios oscilan entre 10 y 30 ha.


Cómo se reproduce

Los erizos tienen dos periodos de celo: primavera y verano. En cada parto nacen de 2 a 10 crías. Normalmente hay una sola camada por temporada, rara vez dos. Las crías nacen ciegas, desnudas y sin púas, pero empiezan a desarrollarlas a los dos días de nacer. Son animales solitarios y tolerantes, aunque los machos pueden llegar a ser territoriales y agresivos con otros erizos durante los periodos de celo. Alcanzan la madurez sexual al año de vida y su esperanza de vida es de 7 años. Muchos mueren atropellados y durante el primer año de vida al no superan la primera hibernación.




Rastros

En las huellas se marcan los cinco dedos y las uñas, tanto en patas como en manos (2,5 cm de largo x 2,8 cm de ancho). El quinto dedo se aprecia menos, pero sí la uña. Excrementos muy característicos, cilíndricos (2-5 cm de longitud x 0,5-1 cm de ancho), de color negro brillante, muy compactos y con muchos restos de semillas e insectos.



Dónde se ve

Es una especie presente en toda la provincia. En la Gran Senda se puede observar prácticamente en todas las etapas, con la excepción de la alta montaña.



Curiosidades

Los erizos son animales muy beneficiosos para el hombre. Su alimentación a base de insectos y babosas y su presencia en cultivos lo convierten en un eficaz controlador de plagas. El poeta griego Arquíloco, al hilo de la sabiduría de los zorros, decía que estos animales podían saber muchas cosas, pero los erizos con saber sólo una, pero muy importante, eran más listos. Les bastaba hacerse una bola de púas para protegerse de cualquier agresión de un depredador.

Especies similares

Especie inconfundible. Solamente se puede confundir con el erizo moruno, algo menor en tamaño y de tono de pelaje más claro. El erizo moruno presenta una banda facial o antifaz negra, está presente en zonas más áridas y por debajo de los 400 msnm. No está confirmada la presencia del erizo moruno en la provincia de Málaga.

Otras especies: Erizo moruno (*Atelerix algirus*)

El erizo moruno es una especie norteafricana que fue introducida en Baleares, Canarias y en la franja Mediterránea andaluza. En la provincia de Málaga aún no hay citas confirmadas de la especie, pero sí en Almería y Granada, así como en Ceuta y Melilla, donde es abundante. Se trata de un insectívoro algo menor en tamaño que el erizo europeo, al que se parece mucho. Tiene un pelaje blanquecino en general, con la cara, las patas y los genitales algo más oscuros. La franja de pelo oscura de la cara, en contraste con la frente más clara, muestra como una forma de antifaz muy característica que le cubre el hocico. Las púas son de un tono claro y presentan un anillo oscuro en la zona central, más cerca de la raíz que de la punta. En la cabeza se nota claramente como las púas no le cubren la frente, dejándola descubierta. Tiene unas callosidades en los pies muy características, así como un dedo pulgar posterior muy pequeño. Del erizo europeo se distingue por su frente despejada de púas, el anillo de las púas, las callosidades en los pies y el antifaz oscuro de la cara. Es una especie de zonas áridas que no suele aparecer lejos del nivel del mar, como mucho a 400 ó 500 msnm.