


GAVIOTA DE AUDOUIN

Ichthyaetus audouinii



Antonio Román Muñoz Juvenil



Diego Jerez

IDENTIFICACIÓN

Presenta un tamaño intermedio entre las gaviotas pequeñas (cabecinegra y reidora) y las grandes (patiamarilla y sombría) de nuestro litoral. En plumaje adulto muestra una apariencia elegante y delicada, con el dorso de un tono gris pálido que contrasta ligeramente con el blanco de las plumas corporales. En vuelo pueden apreciarse los extremos negros de las alas con pequeñas muescas blancas en la punta. Su pico es de un atractivo rojo coral con la punta negra y las patas verdosas. Tarda cuatro años en alcanzar el plumaje adulto. Los jóvenes son oscuros (color chocolate) con la frente muy horizontal, huidiza y las patas grises.

DÓNDE VERLA

Gaviota mediterránea cuyas colonias reproductoras más próximas a nuestro litoral se sitúan en las islas de Alboran y Chafarinas. Es una especie habitual en la costa malagueña gran parte del año, a excepción de la época reproductora, cuando retorna a sus áreas de cría. A diferencia de otras gaviotas, no suele adentrarse al interior de la provincia.

CUÁNDO VERLA

“Invernante” y “en migración”.

Su presencia es mayor durante el invierno, aunque también es frecuente en paso tanto en primavera como en otoño. Algunos ejemplares inmaduros pueden permanecer en nuestro litoral durante el verano.

| | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|

ESPECIES SIMILARES

Puede haber confusión entre los juveniles de esta especie y los de las gaviotas sombría y patiamarilla. Se diferencia de estas por su menor porte y apariencia más estilizada, rostro alargado en forma de “embudo” con la cara pálida, ojos siempre negros y patas de color gris. Además, en vuelo muestra una “U” blanca en el obispillo y un panel blanco en la parte inferior o ventral del ala.