

# ZAMPULLÍN COMÚN o CHICO

## *Tachybaptus ruficollis*



PLUMAJE INVERNAL. Juan Ignacio Álvarez



PLUMAJE NUPCIAL. Eduardo Alba

Longitud: 26 cm Envergadura: 40-45 cm

### IDENTIFICACIÓN

Es el más pequeño de los somormujos y zampullines. Tiene el cuello corto y casi siempre arqueado, el cuerpo rechoncho y la popa redondeada. El pico es corto y recto. En primavera luce una bonita librea, con una mancha amarilla en la base del pico, el cuello castaño y el píleo y el dorso oscuros. En invierno presenta un atuendo más sobrio con el píleo y el dorso marrón oscuros y las partes inferiores de color crema, con el cuello y la popa más claros. No hay diferencia entre sexos y los jóvenes son muy similares a los adultos en plumaje invernal, con unas líneas negras en la base del cuello.

### DÓNDE Y CUÁNDO VERLA

Aparece en una gran variedad de zonas húmedas, tanto naturales como de origen humano, siempre que disponga de plantas sumergidas y un buen desarrollo de la vegetación palustre de las orillas para camuflar su nido. Podemos encontrarlo en lagunas de origen artificial, como la laguna de Santa Inés, los Lagos del parque Tecnológico o algunos estanques urbanos de Mijas Costa.

ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

### CURIOSIDADES

Como su nombre sugiere, esta ave acuática se sumerge para capturar insectos, pequeños peces y material vegetal, reapareciendo a cierta distancia, haciendo gala de un notable buceo en apnea. En esta especie ambos miembros de la pareja construyen un nido flotante empleando plantas en descomposición. Parece ser que el calor desprendido de la putrefacción de este material vegetal ayuda a la incubación de los huevos.