

CERNÍCALO PRIMILLA

Falco naumanni



Eduardo Antúnez



Jacinto Segura

Longitud: 27-33 cm Envergadura: 62-72 cm

IDENTIFICACIÓN

Muy parecido al cernícalo vulgar. El macho se diferencia de este por presentar el dorso sin motas oscuras, la cabeza gris lisa y el pecho ocre anaranjado. La hembra y los jóvenes, se distinguen de los del vulgar por las mejillas y partes ventrales más claras y el barrado más fino. Posados, ambos sexos muestran una cola proporcionalmente más corta que la del vulgar y uñas blanquecinas. Su fenología estival, carácter colonial y reclamo más estridente y ronco que el del vulgar son otros aspectos que ayudan a diferenciarlos.

DÓNDE Y CUÁNDO VERLA

Aunque su medio preferente son las áreas agrícolas, también forma colonias en medios urbanos, nidificando en edificios históricos donde encuentran mechinales y huecos donde realizar la puesta. Estos primillas urbanos se desplazan a alimentarse a zonas agrícolas y áreas abiertas del extrarradio de las ciudades. Aunque se encuentran en franca regresión, aún podemos encontrar colonias urbanas de primilla en Antequera, Álora, Ronda, Manilva y Casares.

Aunque es una especie estival, ocasionalmente se pueden ver algunos ejemplares durante el invierno en zonas costeras.

ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

CURIOSIDADES

En las últimas décadas han desaparecido gran parte de las colonias urbanas de esta especie en la provincia, debido a la pérdida de lugares óptimos para la nidificación, por una rehabilitación inadecuada de edificaciones, y al crecimiento urbano a costa de sus zonas de alimentación. Este es el caso de las iglesias de San Juan y San Pablo en Málaga, el Castillo de la Duquesa (Manilva), y la torre de la sal (Casares).