

ANDARRÍOS CHICO

Actitis hypoleucos



Manuel Moreno

Longitud: 19 cm

IDENTIFICACIÓN

Limícola pequeño de patas cortas y aspecto rechoncho, con una silueta predominantemente horizontal. Es característico de esta especie el continuo balanceo de cabeza y cola cuando está posada. Tiene el dorso de color pardo grisáceo y las partes inferiores blancas. El pecho también es pardo, separado del ala por una "cuña" blanca.

Efectúa un vuelo raso sobre el agua durante el cual puede apreciarse una ancha franja alar blanca.

DÓNDE Y CUÁNDO VERLA

Ave acuática frecuente en los tramos urbanos de los ríos, siempre que presenten agua. Puede verse en el río Guadalmedina a su paso por la ciudad, en la presa del Agujero, en los lagos del Parque tecnológico y en los canales y acequias de los entornos urbanos.

Estival, de paso e invernante.

| | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|

CURIOSIDADES

El andarríos pertenece al grupo de los limícolas, aves especializadas en alimentarse de invertebrados presentes en los suelos húmedos y fangosos de ríos, lagos y marismas. La longitud del pico de los limícolas está relacionada con el tipo de presa que capturan y a la profundidad que se hallen. El andarríos tiene un tamaño de pico intermedio mientras que otras limícolas como las agujas o los zarapitos presentan picos muy largos que les permiten capturar gusanos y otros invertebrados a mayor profundidad.