



# C-Blanca

*Polygonia c-album* (Linnaeus, 1758)

## DESCRIPCIÓN

Envergadura alar: 3,5 a 5 cm. **Alas cerradas:** complejo diseño, con diferentes tonalidades marrones y grises; destaca la mancha central del ala trasera, en forma de C en un ala, de C invertida en la otra, que le da el nombre a la especie. En ambas alas, el contorno es exageradamente irregular, con picos y con un gran arco en la delantera y una apéndice prominente en la trasera. Los borde tienen además manchas azuladas rodeadas de negro y, hacia el interior, series de puntos negros rodeados de azul o gris. **Alas abiertas:** naranja intenso con profusión de grande manchas marrón oscuro; el borde trasera de cada ala tiene una ancha banda marrón, con manchas amarillentas en su interior.

## CLAVE VISUAL DE IDENTIFICACIÓN





### ESPECIES PARECIDAS

hace inconfundible.

La C blanca cuando está cerrada y, en cualquier caso, su contorno exageradamente irregular, la

### BIOLOGÍA Y HÁBITAT

Tiene dos o tres generaciones anuales, hibernando en estado adulto. En Málaga es bastante rara y se desconocen detalles de su biología, más allá de las fechas de las escasas observaciones y el habitat donde vive, un bosque de ribera bien conservado, con presencia de chopos (*Populus nigra*), olmos (*Ulmus minor*) y fresnos (*Fraxinus angustifolia*). Las orugas se alimentan de ortigas (*Urtica spp.*), lúpulo (*Humulus lupulus*) y olmos (*Ulmus spp.*).

|     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|

### DISTRIBUCIÓN

Es una de las mariposas más raras y escasas de Málaga. Hasta hace poco, solo conocida de sierra de Tejada, de donde no se tiene constancia de su presencia desde que fuera citada a finales de los años 70. En 2013 fue redescubierta en la provincia, en una nueva localidad, concretamente en el arroyo de Marín, Archidona, durante un muestreo de la Asociación Alas. Está por tanto en la etapa 12 de la GSM, aunque de manera muy escasa y localizada. No se descarta que puedan encontrarse poblaciones relictas en los recorridos de las sierras Tejada y Almijara (etapas 5 a 8), así como en los que transitan por el arroyo del Bebedero (14 y 15), los ríos Turón, Guadiaro y cuenca del Genal (23, 25, 27 y 28 respectivamente).

