


CARBONERO GARRAPINOS

Periparus ater



Huberto Garcia

Longitud: 11,5 cm

IDENTIFICACIÓN

Muy parecido al carbonero común, con el que coincide en presentar una cabeza grande y redondeada, negra con las mejillas blancas. Sin embargo, se distingue fácilmente de este por la ausencia de "corbata negra", su menor tamaño y el tono ocre de las partes ventrales.

También los cantos de ambos carboneros pueden parecerse, ya que alternan repetitivamente notas agudas y graves, pero el del garrapinos pone el acento en la nota grave (tsiCHU-tsiCHU-tsiCHU), mientras que el común acentúa la aguda (TI-ta-TI-ta-TI-ta).

DÓNDE Y CUÁNDO VERLA

Muestra una fuerte preferencia por pinares aunque también aparezca en otras masas forestales. Es una especie frecuente en los parques y jardines urbanos, sobre todo si disponen de pinos.

A diferencia del carbonero común suele moverse por las parte alta de los arboles, rara vez desciende al suelo o se desplaza por arbustos o matorrales.

ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

CURIOSIDADES

La procesionaria del pino (*Thaumetopoea pityocampa*) es una plaga frecuente en pinares urbanos. Las orugas de esta mariposa nocturna presentan pelos urticantes que producen irritación y alergias a las personas y mascotas. Los carboneros garrapinos y común son unos eficaces depredadores de la procesionaria del pino, así que un medio eficaz de controlar este plaga en los ambientes urbanos y reducir sus riesgo sobre la salud es cuidar y mejorar las poblaciones de estas aves insectívoras, con medidas como la instalación de cajas nido, evitar las tareas de podas en la época de cría o minimizar el uso de químicos en los tratamientos insecticidas.