


CURRUCA CAPIROTADA

Sylvia atricapilla



Eduardo Antúnez

IDENTIFICACIÓN

Curruca de tamaño mediano (13 cm) y aspecto corpulento. Su rasgo más distintivo es una vistosa “boina” en la parte superior de la cabeza, negra en los machos, y castaño en las hembras y juveniles. Presenta un plumaje de color pardo en el dorso y gris claro en las partes inferiores, con tonos más claros y rosados en las hembras. A diferencia de la mayoría de las curruca no presenta blanco en la garganta ni en las plumas externas de la cola. Tiene un canto melodioso y aflautado que recuerda al del mirlo.

DÓNDE VERLA

Presente en bosques de ribera y en masas forestales frescas y húmedas con abundante sotobosque. Aparece también en parques y jardines con árboles de gran porte, así como en olivares durante los meses fríos. Muy abundante en toda la provincia durante el paso y la invernada, y cada vez más frecuente como reproductor.

CÓMO VIVE

Es la curruca más arbórea en nuestra provincia. Construye un nido bastante sencillo a baja altura en árboles o arbustos y realiza dos puestas anuales de 4 a 6 huevos. Durante la época reproductora se alimenta de pequeños invertebrados y en otoño e invierno de bayas y gran variedad de frutos (moras, lentiscos, higos...). En la estación invernal se suman a la población residente un gran número de curruca procedentes del norte de Europa, siendo esta una de las aves invernantes más frecuente en los bosques malagueños.

CUÁNDO VERLA

Residente e invernante.

ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	díc
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

ESPECIES SIMILARES

Curruca mosquitera (*Sylvia borin*) y curruca cabecinegra (*Sylvia melanocephala*).