

VENCEJO PÁLIDO

Apus pallidus



Manuel Moreno



Eduardo Alba

Longitud: 16-18 cm Envergadura: 44-46 cm

IDENTIFICACIÓN

Es muy parecido al vencejo común con respecto al tamaño y, dependiendo de las condiciones de luz, puede resultar difícil diferenciar visualmente ambas especies, aunque el tono de su plumaje es más claro y el blanco de la garganta más amplio. Tiene un aspecto ligeramente más robusto, con la cabeza y cuello más gruesos. Las plumas del pecho tienen una apariencia escamada. Las puntas de las alas son más romas y la horquilla de la cola es menos pronunciada.

La forma de vuelo de ambas especies de vencejo es casi idéntica, aunque el pálido realiza aleteos más suaves y lentos, y planeos más prolongados. El mejor rasgo para distinguir ambas especies es la llamada. Esta especie emite un sonido disílabo, más grave (piii-ii o piiui), mientras que el vencejo común va repitiendo varios chillidos monosílabos, más agudos y estridentes.

DÓNDE Y CUÁNDO VERLA

Presenta el mismo hábitat que el vencejo común, nidificando en oquedades de edificios urbanos.

El vencejo pálido llega a nuestras ciudades las primeras semanas del mes de marzo. Los ejemplares más rezagados abandonan nuestro territorio en octubre dirigiéndose a sus cuarteles de invernada.

ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

CURIOSIDADES

Su nombre local es avión. Es un migrador transahariano con algunos registros invernales en Málaga; estos avistamientos parecen hacerse más frecuentes durante los últimos años. Estas citas podrían no corresponder con una verdadera invernada de la especie, sino a la elevada capacidad de movimiento que tienen sus ejemplares, algunos de los cuales podrían invernar al norte del Sáhara y alcanzar el sur de la península en momentos concretos.