


RABILARGO

Cyanopica cooki



Eduardo y Javier Alba

IDENTIFICACIÓN

Córido de vistoso plumaje y apariencia estilizada, en la que destaca su larga cola. Ambos sexos son iguales y generalmente nos alertan de su presencia con su característico reclamo, con el que se mantienen en grupo. La cabeza es negra, con un pico largo y fuerte del mismo color. El manto es pardo-rosado, con las alas y la cola de un bonito azul tornasol, con el borde de las primarias negras. Las partes inferiores son de color crema con tonos rosados, más claro en la garganta. Los tarsos son negros y largos. Los jóvenes son pardos, con la cabeza negruzca o marrón.

DÓNDE VERLA

Especie ligada a zonas arboladas que utiliza preferentemente zonas donde predominan los mosaicos de cultivos con arbolado, tales como dehesas y bosques aclarados. En la provincia las poblaciones de rabilargos están restringidas a la comarca Nororiental y zona de Antequera, aunque parece registrarse una expansión hacia la zona noroccidental.

CÓMO VIVE

Es una especie muy gregaria que vive todo el año formando grupos que comparten territorio. Tienen una gran cohesión social, y los miembros del grupo colaboran en la detección de alimento, de depredadores, en la defensa de los nidos e incluso en la alimentación de los pollos. Su alimentación es omnívora, con preferencia hacia los grandes insectos, lombrices y larvas durante la primavera y parte del verano, mientras que en los meses de otoño e invierno consumen fundamentalmente frutos y semillas, mostrando predilección por las bellotas y aceitunas. También puede comer pollos de otras aves paseriformes, carroña e incluso alimentarse de residuos humanos.

CUÁNDO VERLA

Residente.

ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	díc
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

ESPECIES SIMILARES

Inconfundible, aunque si no percibimos el tamaño de la cola podría confundirse con el arrendajo (*Garrulus glandarius*).