



COMADREJA

Mustela nivalis



Identificación

Carnívoro de tamaño pequeño con una longitud cabeza-cuerpo de 17 a 23 cm, cuerpo alargado, patas cortas y cola larga de 3 a 17 cm. La cabeza es achatada, con orejas redondas y chicas (1), y el cuello alargado. El hocico es corto y los ojos pequeños. El pelaje dorsal es marrón claro o crema; el vientre o babero es blanco (2). La cola es marrón. Es un animal muy nervioso, lo que se refleja en sus movimientos rápidos e inquietos. Los machos son ligeramente mayores en tamaño que las hembras.



Fenología

Reproducción Celo

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Dónde vive

Especie adaptable a todo tipo de ambientes, pero con preferencia por zonas de matorral bajo y cultivos en los que existan afloramientos rocosos, muretes de piedra y prados no muy húmedos, pero con agua cercana. También utiliza setos y linderos, acúmulos de leña y entornos de viviendas rurales que cumplan sobre todo con el requisito de que haya alimento disponible. Evita los bosques cerrados y las zonas encharcadas.

Cómo vive

Es un animal huidizo y difícil de observar, de hábitos tanto nocturnos como diurnos pero solitarios. Se mueve muy rápido y es silenciosa y ágil. Trepa con mucha facilidad. Gracias a su morfología está capacitada para entrar y salir de oquedades con facilidad, las cuales explora en busca de presas. Se alimenta de pequeños animales insectívoros, roedores, insectos, lombrices, anfibios, reptiles y frutos. También es capaz de capturar presas de mayor tamaño, como conejos, palomas u otras aves, incluso de corral. Los territorios oscilan entre 10 y 35 ha. Normalmente el territorio del macho incluye los de varias hembras. Los machos capturan presas más grandes que las hembras y a cielo abierto. Las hembras suelen cazar entrando en madrigueras. Los cubiles suelen estar ubicados en huecos de árboles o en muretes de piedra durante el verano y en grutas u oquedades de construcciones abandonadas en invierno.

Cómo se reproduce

Las comadreja entran en celo sobre todo en primavera, aunque pueden estarlo casi todo el año. Durante el celo los machos son muy territoriales y agresivos. Es la única época del año en que abandonan su soledad. Los partos pueden ocurrir casi todo el año, aunque lo más frecuente es que las crías nazcan entre mayo y junio. Pueden tener hasta tres partos al año, más frecuentemente dos. En cada camada nacen entre 4 y 8 crías, que son sexualmente activas a los tres meses. La esperanza de vida de las comadreas es de menos de un año.



Rastros

Huellas pequeñas (1,3-1,5 cm de largo x 1 cm de ancho). Marcan cinco dedos en ambas patas. Excrementos también pequeños (3-6 cm de longitud x 2-3 mm de ancho) y con restos de huesos, pelos y plumas. Están cubiertos de un mucus cuando están frescos y terminan en mechones de pelos en los extremos.



Delantera




Stephan Morris / Shutterstock.



Dónde se ve

Especie presente prácticamente en toda la provincia, aunque no es abundante ni frecuente ni fácil de ver. En la Gran Senda se puede observar en casi todas las etapas.



Curiosidades

Las comadreja tienen fama de feroces y agresivas, de beber la sangre de sus presas. Y es cierto. Cuando cazan lo hacen de forma rápida, silenciosa y letal. Se acercan a sus presas en silencio y la inmovilizan aferrándose a ellas con las patas y con sus afiladas uñas. Con un rápido mordisco en la nuca la matan casi por shock. Es entonces cuando beben un poco de su sangre, un primer momento de placer antes de arrastrarla a un lugar seguro donde ya la devoran. Una sola comadreja puede matar al año más de 500 ratones, así que su ferocidad es un buen aliado del hombre. Su alto nivel metabólico le obliga a estar cazando todo el día para compensar su elevado gasto energético. Es lo que tiene ser tan nerviosa y vivir tan poco tiempo: están obligadas a vivir deprisa. Por eso se atreven a matar presas de tamaño hasta 15 veces mayor que el suyo.

Especies similares

Especie inconfundible. Aunque es muy parecida a la garduña, su menor tamaño impide la confusión. Las garduñas, además, no tienen la punta de la cola negra.