



# Cardenillo

*Tomares ballus* (Fabricius, 1787)

## DESCRIPCIÓN

Envergadura alar: 2,4 a 3 cm. **Alas cerradas:** la superior naranja, con mayor o menor intensidad; serie de puntos negros con los bordes celestes, a veces inapreciables; bordes de color marrón y anchos. El ala posterior, muy peluda, verde intenso, con el borde posterior marrón, más ancho en la parte de arriba; a veces individuos viejos pueden haber perdido el color naranja, mostrándose de color marrón. **Alas abiertas:** casi imposible de ver así. Ambos sexos de color marrón, con amplias manchas naranjas en el caso del macho.

## CLAVE VISUAL DE IDENTIFICACIÓN




Foto: Rafael Obregón Romero



### ESPECIES PARECIDAS

Solo confundible, cuando se encuentra con las alas cerradas, muy desgastada y ha perdido el color verde, con **Manto bicolor**, pero esta última solo tiene una serie de puntos en el ala superior y carece de las manchas celestes en torno a éstos.



### BIOLOGÍA Y HÁBITAT

Con una generación anual, vuela durante el invierno y la primavera, principalmente en marzo. Vive en entornos por lo general muy transformados, con escasa vegetación y preferiblemente llanos, como eriales, baldíos y terrazas fluviales, olivares y almendrales abandonados con escasa vegetación en el suelo. En estos lugares, las orugas se alimentan de leguminosas, principalmente rastreras y de bajo porte, como alfalfas (*Medicago spp.*) y tréboles (*Trifolium spp.*).

ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	díc
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

### DISTRIBUCIÓN

Ampliamente distribuida por la GSM, generalmente en las etapas menos agrestes y siempre de manera escasa y localizada, especialmente en las etapas del norte provincial y las costeras. No se descarta que pueda aparecer en las etapas en las que hasta el momento es desconocida.

