


Familia Sylviidae

# CURRUCA CARRASQUEÑA

*Sylvia cantillans* / *S. inornata*



Macho adulto

JLMR



Hembra joven

ARL

## IDENTIFICACIÓN

Ave pequeña e inquieta que presenta distintos plumajes según el sexo y la edad. Machos con el dorso gris pizarra oscuro; una marcada bigotera blanca **1** y la garganta, el pecho y los flancos naranja-rojizos **2**. Las hembras son mucho más pálidas, sobre todo en las partes inferiores y a menudo la bigotera blanca es apenas perceptible. La cola es gris oscuro en ambos sexos con bordes laterales blancos **3**. Durante el otoño, los machos cambian de librea, aclarando la coloración anaranjada-rojiza hasta parecer rosada. Los jóvenes del año son parecidos a las hembras adultas, aún más pálidos en sus partes inferiores y gris-pardusco en las partes superiores. Ambos sexos presentan un anillo ocular rojo, más marcado en los machos, rodeado de blanco **4**, más evidente este último tono en las aves jóvenes.

## ESPECIES SIMILARES

Sólo la curruca rabilarga guarda parecido con el plumaje del macho adulto de la curruca carrasqueña. Los plumajes de los jóvenes y las hembras de esta especie pueden ser confundidos con los de las curruca tomillera, zarcera, cabecinegra y mosquitera, si bien ninguna de estas especies reúne las cuatro características descritas en el apartado anterior.

## DÓNDE VERLA

Ave de matorral noble como el coscojar, presente sobre todo en las primeras etapas de degradación del bosque mediterráneo y en encinares jóvenes. Durante los pasos migratorios, individuos aislados de esta especie pueden ser observados en ambientes completamente diferentes.

## CUÁNDO VERLA

ESTATUS

ESTIVAL

ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

