



Velada de negro

Coenonympha dorus (Esper, 1782)

DESCRIPCIÓN

Envergadura alar: 2,5 a 3,4 cm. **Alas cerradas:** color marrón claro, cremoso. En el ala delantera, un gran ocelo en el ápice, rodeado de un anillo anaranjado o amarronado; ocasionalmente puede tener un ocelo muy pequeño adherido a la parte inferior. En el ala trasera, serie de ocelos cercanos al borde posterior, con uno separado por una franja blancuecina. En ambas alas, tiene una línea plateada que recorre todo el borde trasero. **Alas abiertas:** casi imposible de observar así. El macho con el ala delantera marrón y la trasera anaranjada; la hembra con ambas alas anaranjadas. En ambos casos pueden ser visibles los ocelos del exterior.

CLAVE VISUAL DE IDENTIFICACIÓN




Foto: Rafael Obregón Ronero



ESPECIES PARECIDAS

Su color, líneas plateadas y serie de ocelos bien patentes la hace inconfundible.

BIOLOGÍA Y HÁBITAT

Vuela desde mayo a septiembre, más común y abundante en julio y agosto.

Amante del calor, se encuentra principalmente en entornos montañosos, a menudo lugares secos y expuestos, pedregosos, con matorral disperso, espartales y olivares serranos abandonados o con poca carga de biocidas. Las orugas se alimentan de diversas gramíneas, entre ellas los géneros *Aegilops*, *Brachypodium*, y *Stipa*, además de la ciperácea lastoncillo (*Carex halleriana*).

ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	díc
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

DISTRIBUCIÓN

Distribuida en mayor o menor medida por casi todas las etapas de la GSM, siempre de manera localizada. Está ausente en las litorales y algunas del norte provincial.

