

# CARBONERO GARRAPINOS

*Periparus ater*



Juan Luis Muñoz

## IDENTIFICACIÓN

Es el más pequeño de nuestros páridos. Tiene un aspecto redondeado y la cabeza grande en proporción al cuerpo. La parte superior de la cabeza es negra, con una distintiva mancha blanca en la nuca. Las mejillas son también blancas. Bajo el pico, corto y fino, presenta un babero negro. El dorso y las alas son de color gris azulado y estas últimas presentan un moteado blanco en las plumas cobertoras. Las partes inferiores son blanquecinas con tonos ocre en los flancos.

## DÓNDE VERLA

Habitante de bosques de coníferas, con preferencia por las formaciones de pináceas, principalmente pinares, aunque también pinsapares. También ocupa bosques mixtos e incluso aparece en jardines y parques urbanos, sobre todo si disponen de pinos. No es exigente con respecto a la altura ya que aparece desde parques a nivel del mar, hasta las formaciones arbóreas de mayor altitud de la provincia. En otoño e invierno puede aparecer en otros ambientes forestales.

## CÓMO VIVE

Suele moverse por las partes altas de los árboles y rara vez se desplaza por el suelo. Se alimenta de insectos y otros invertebrados que caza, a veces en acrobáticas posturas, en las ramas más finas de los pinos. Muestra preferencia por larvas de procesionaria, congregándose en los bolsones para capturarlas. Normalmente instala su nido en huecos de los árboles, aunque también puede utilizar oquedades en taludes o incluso en el propio suelo. Tiene una puesta de 6-9 huevos blancos. En otoño e invierno ingiere semillas de coníferas, e incluso puede almacenar provisiones. En época de cría es territorial pero en invierno forma bandos mixtos con otros páridos.

## CUÁNDO VERLA

Residente.

ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

## ESPECIES SIMILARES

Carbonero común (*Parus major*).