


Familia Laniidae  
**ALCAUDÓN COMÚN**  
*Lanius senator*



Adulto



Joven

**IDENTIFICACIÓN**

Ave de talla mediana con una cabeza roja muy conspicua en todos los plumajes **1** excepto durante los primeros meses de volantón. El vientre y la garganta son blancos, el dorso es negro, tiene franjas blancas en las alas **2** y un antifaz negro que le cubre los ojos. La cola es de color negro con los bordes blancos. El pico tiene forma de gancho, similar al de una pequeña rapaz **3**. Los jóvenes recién salidos del nido presentan una librea gris y blanca muy moteada.

**ESPECIES SIMILARES**

El adulto es inconfundible. Los jóvenes se podrían confundir con los de alcaudón real, pero estos son bastante mayores y no muestran el aspecto moteado del joven de alcaudón común.

**DÓNDE VERLA**

Habitual en ambientes mediterráneos abiertos, con árboles y matorrales dispersos. Típico de dehesas, olivares, sotos, campiña y bordes de campos de cultivo. Presente en casi toda la provincia, sobre todo durante los pasos migratorios de primavera y otoño, cuando puede ser observado prácticamente en cualquier ambiente.

**CUÁNDO VERLA**

**ESTATUS ESTIVAL**

ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

