



Veloz de las rieras (Spanischer Artenname)

Gegenes nostradamus (Fabricius, 1793)

BESCHREIBUNG

Flügelspannweite: 2,5 bis 3,2 cm. **Flügelunterseite:** ist hellgrau oder hellbeige ohne Muster. Nur das Weibchen hat in der Mitte der Vorderflügel kleine weiße Flecken, die jedoch nicht immer erkennbar sind. **Flügeloberseite:** ist normalerweise nur schwer zu sehen, dunkelbraun mit einigen weißen Flecken auf den Vorderflügeln der Weibchen.

ABBILDUNG ZUR IDENTIFIZIERUNG



Weißer Flecken bei den Weibchen



Dunkelbraune Farbe; weiße Flecken bei den Weibchen

ÄHNLICHE ARTEN

Borbo borbonica: selten mit geöffneten Flügeln zu beobachten. Die Flügelunterseite ist gelblich mit schwarzen Punkten, auf dem Hinterflügel sind einige davon in der Mitte weiß, während die Punkte auf dem Vorderflügel größer und ausschließlich weiß sind.



BIOLOGIE UND LEBENSRAUM

Seine Flugzeit erstreckt sich vom Frühling bis zum Herbstanfang. Es gibt zwei, direkt aufeinanderfolgende Generationen, die größte Anzahl von Exemplaren lebt im Sommer und Herbst.

Sein bevorzugter Lebensraum sind die Unterläufe von Flüssen und Bächen, die fast das ganze Jahr über ausgetrocknet sind, aber auch die weitläufigen Flussbetten. Er kommt auch – zwar immer weniger – an Dünen oder Sandstränden oder morastigen Küstengebiet vor. Er ist ein Wanderfalter, den man manchmal sogar in den Städten, oft auf Zierpflanzen in Parks und Gärten beobachten kann. Er lebt immer auf weniger als 400 Metern Höhe.

Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

VERBREITUNG

Wenige Exemplare konnten bisher auf den niedriger gelegenen Etappen des GWM an ganz bestimmten Stellen vor. Dazu gehören trockene Unterläufe von Flüssen und Bächen oder Flussbetten, die nur zu einer bestimmten Jahreszeit Wasser haben. Es ist nicht auszuschließen, ihn auch an anderen geeigneten Stellen des GWM im Norden der Region zu entdecken.

